



FINDIKTA KAHVERENGİ KOKARCA MÜCADELESİ

- 1 kahverengi kokarca sezon boyunca yaklaşık **500** adet findıkta zarar oluşturabilir.
- Bu miktar yaklaşık **1 kg** kabuklu findığa karşılık gelir.
- Mücadelenin temel amacı, erken dönemde **“BOŞ İÇ”**, geç dönemde ise **“LEKELİ İÇ (ACILAŞMA)”** zararını önlemektir.



KRİTİK UYARI

Kahverengi kokarca, odunsu kabuğu delerek olgunlaşan findıklarda da beslenebilir. Bu nedenle bahçeler Temmuz sonuna kadar düzenli olarak kontrol edilmelidir.

İLAÇLAMA KARARI

- ✓ Bahçeyi temsil eden 10 ocak, 3 × 4 m beyaz çarşaf üzerine silkelenerek kontrol edilir.
- ✓ 10 ocakta ortalama **≥5 ergin veya nimf** bulunursa ilaçlama yapılmalıdır.
- ✗ Bu eşiğin altında ilaçlama önerilmez.

ÖNERİLEN İLAÇLAMA ZAMANLARI

- 1 Mayıs sonu – Haziran başı**
Kışlamış ergin baskılama
- 2 Haziran ortası** ● (Kritik dönem – 1)
Boş iç oluşumunu önleme
- 3 Temmuz başı** ● (Kritik dönem – 2)
Nimf + yeni nesil ergin baskılama → buruşuk ve lekeli iç önleme
Temmuz başında 1 ilaçlama yapılır, popülasyon yoğunluğu devam ederse 10-14 gün sonra ikinci ilaçlama yapılır.

✓ Bitki koruma ürünlerini etiket bilgilerine uygun olarak kullanınız.

📅 Hasat ile son ilaçlama arasındaki bekleme süresine mutlaka uyunuz.

ℹ Bilgi için İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurunuz.